



Paciente: **Cibely Oliveira Mattos**
Idade: **19 anos 2 meses 14 dias**
Solicitante: **KELSO PASSOS DA SILVA**

Pedido: **21550**
Sexo do Pac.: **FEMININO**
Data do Exame: **01/10/2025**

ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA.

DADOS CLÍNICOS: Pesquisa de endometriose profunda.

ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS:

Gestações: 0

ÚTERO:

Posição: Ante-verso flexão. **Localização:** Centrado. **Formato:** Piriforme. **Contornos:** Regulares.

Dimensões: Long: 6,20 cm x **Ânt-Post:** 2,40 cm x **Transv:** 6,20 cm

Volume: 47,97 cm³ (Referência: 25,00 a 90,00cm³)

Miométrio: Homogêneo.

Endométrio: O eco endometrial é irregular e mede 2,1 mm de espessura.

OVÁRIO DIREITO:

Localização: Para-uterino. **Contorno:** Regulares. **Textura:** Habitual.

Dimensões: Long: 2,40 cm x **Ânt-Post:** 1,30 cm x **Transv:** 1,90 cm

Volume: 3,08 cm³ (Referência: 3,00 a 9,00cm³)

OVÁRIO ESQUERDO:

Localização: Para-uterino. **Contorno:** Regulares. **Textura:** Habitual.

Dimensões: Long: 3,20 cm x **Ânt-Post:** 1,40 cm x **Transv:** 2,20 cm

Volume: 5,13 cm³ (Referência: 3,00 a 9,00cm³)

FUNDO DE SACO DE DOUGLAS: Livre.

EXAME DIRECIONADO PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA:

Ligamentos redondos, ausência cirúrgica.

Ligamentos uterossacro espessados bilateralmente e acometidos por lesões endometrióticas.

Na região retrocervical nota-se tecido hipoecóico, irregular, medindo 1,9 x 1,1 cm, prolongando-se lateralmente até a inserção dos ligamentos uterossacos.

Recesso vesico uterino sem evidências de focos de endometriose.

Retossigmoides com boa estatificação de suas camadas.

Não há sinais de endometriose profunda no ceco.

Apêndice cecal caracterizado e de aspecto ecográfico normal.

Diafragma de aspecto ecográfico normal.



Paciente: **Cibely Oliveira Mattos**
Idade: **19 anos 2 meses 14 dias**
Solicitante: **KELSO PASSOS DA SILVA**

Pedido: **21550**
Sexo do Pac.: **FEMININO**
Data do Exame: **01/10/2025**

ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA.

Fórnice vaginal sem evidências de focos de endometriose.

Bexiga sem evidências de focos de endometriose.

Uretra sem evidências de focos de endometriose.

OPINIÃO DO RELATÓRIO:

* Ecografia sugestiva de:

- Endometriose pélvica e profunda com lesões nos seguintes sítios:
 - Em ligamentos uterossacro bilateralmente;
 - Em região retrocervical.

Obs: Lesões superficiais, peritoneais ou diafragmáticas, podem não serem vistas ao ultrassom (limitação do método).